

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa towaru (opis przedmiotu zamówienia)	Oferowany produkt (producent, numer katalogowy)	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Szczepionka przeciwko WZW A+B; (przeciwno WZW A inaktywowana, przeciwno WZW B rDNA, adsorbowana). Dla młodzieży i dorosłych od ukończenia 16 roku życia, cykl szczepień 0-1-6 miesięcy.		100	1,0 ml ampułkostrzykawka			
2.	Szczepionka przeciwko WZW A inaktywowana, dla dzieci od 13 miesiąca życia do 18 roku życia włącznie, cykl szczepień 0 - (6-12 miesięcy).		20	0,5 ml ampułkostrzykawka			
3.	Szczepionka przeciwko WZW A inaktywowana, adsorbowana dla osób dorosłych od 19 roku życia, cykl szczepień 0 - (6 do 12 miesięcy).		300	1,0 ml ampułkostrzykawka			
4.	Szczepionka przeciwko WZW A inaktywowana, adsorbowana dla młodzieży od 16 roku życia i osób dorosłych cykl szczepień 0 - (6 do 12 miesięcy).		500	0,5 ml ampułkostrzykawka			
5.	Szczepionka przeciwko durowi brzuszному z polisacharydem otoczkowym Vi, dla osób powyżej 2 roku życia, cykl szczepień 1 dawka na 3 lata.		500	0,5 ml ampułkostrzykawka			
6.	Szczepionka przeciwko błonicy i tężcowi adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenu dla osób powyżej 7 roku życia, cykl szczepień 0-1-(6-12 miesięcy).		700	0,5 ml ampułka lub opakowanie 15 dawkowe			

7.	Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (inaktywowana), od 16 roku życia, cykl szczepień 0 - (1-3miesiący) - (5-12 miesięcy), co 3 lata dawka przypominająca, z zarejestrowanym przyśpieszonym cyklem szczepień 0-14 doba, 5-12 miesięcy zawierającą szczep Neudörfl.		10	0,5 ml ampułkostrzykawka			
8.	Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (inaktywowana) od 12 roku życia i dorosłych, cykl szczepień: 0- (1-3miesiący) - (9-12 miesięcy) z zarejestrowanym skróconym schematem szczepień: 0 -7 doba- 21 doba, po 12-18 miesiącach dawka przypominająca, zawierająca szczep K23		10	0,5 ml ampułkostrzykawka			
9.	Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce dla osób od 12 miesiąca życia, cykl szczepień 1 dawka		10	0,5 ml ampułkostrzykawka lub fiolka (лиофилизат + rozpuszczalnik)			
10.	Szczepionka przeciwko poliomyelitis inaktywowana dla osób po ukończeniu 6 tygodnia życia lub po ukończeniu 2 miesiąca życia, Nieszczepione osoby dorosłe - cykl szczepień 0-1-12 miesięcy,		50	0,5ml ampułkostrzykawka			
11.	Szczepionka przeciwko grypie czterowalentna ,inaktywowana, szczepionka typu „Split”, szczepionka na sezon 2018/2019		50	0,5 ml ampułkostrzykawka			
12.	Szczepionka przeciwko żółtej febrze-atenuowana, dla osób powyżej 6 miesiąca życia, cykl szczepień 1 dawka. Okres ochronny wynosi przynajmniej 10 lat i może utrzymywać się przez całe życie.		300	0,5 ml лиофилизат + rozpuszczalnik w ampułkostrzykawce			
13.	Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom grupy A, C, W 135, Y cykl szczepień 1 dawka		50	0,5 ml лиофилизат + rozpuszczalnik			

14.	Szczepionka przeciwko wścieklźnie inaktywowana, dla dzieci i dorosłych, cykl szczepienia profilaktycznego: szczepienie podstawowe - 3 wstrzyknięcia w dniach 0, 7 i 28, dawka uzupełniająca po upływie 1 roku.		50	0,5 ml liofilizat + rozpuszczalnik ampułkostrzykawka			
15.	Szczepionka przeciwko WZW B rekombinowana dla dorosłych z zarejestrowanym przyśpieszonym cyklem szczepień 0- 7 dzień -21 dzień - 1rok.		50	1,0 ml fiolka lub ampułkostrzykawka			
16.	Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenów dla osób w wieku od 3 lat ,jako szczepienie przypominające.		200	0,5 ml ampułkostrzykawka			
17.	Szczepionka przeciwko cholerze, inaktywowana, doustna, dla osób po ukończeniu 2 roku życia, cykl szczepień: dzieci 2-6 lat szczepienie podstawowe- 3 dawki, dawka przypominająca po 6 miesiącach, dorośli i dzieci powyżej 6 r. ż. szczepienie podstawowe 2 dawki, dawka przypominająca po 2 latach.		50	opakowania dwudawkowe			
18.	Szczepionka przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu, inaktywowana, adsorbowana, dla osób od 2 miesiąca życia, cykl szczepienia podstawowego: 2 dawki w odstępie 28 dni,		50	0,5 ml ampułkostrzykawka			

19.	Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana, dla osób w wieku od 2 miesiąca życia cykl szczepień: niemowlęta od 2 do 5 miesiąca życia szczepienie pierwotne -3 dawki niemowlęta od 6 miesiąca życia dzieci, młodzież i dorośli - szczepienie pierwotne- 2 dawki		10	0,5 ml ampułkostrzykawka			
	RAZEM						

Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.

Termin ważności szczepionki przeciwko grypie minimum 6 miesięcy od dnia dostawy.

Terminy dostaw 4 dni !!!

Potwierdzenie przechowywania preparatów szczepionkowych w warunkach chłodniczych (+2°C - +8°C), w trakcie transportu.

Preparaty szczepionkowe będą odbierane przez Wojewódzką Stację Sanitarно- Epidemiologiczną w Katowicach w ilości odpowiadającej bieżącemu zapotrzebowaniu.