

## Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa towaru<br>(opis przedmiotu zamówienia)                                                                                                                                                           | Oferowany produkt<br>(producent, numer katalogowy) | Ilość | Jednostka miary                                   | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 1.  | Szczepionka przeciwko WZW A+B;<br>(przeciwko WZW A inaktywowana,<br>przeciwko WZW B rDNA, adsorbowana).<br>Dla młodzieży i dorosłych od ukończenia<br>16 roku życia.<br>cykl szczepień 0-1-6 miesięcy. |                                                    | 200   | 1,0 ml<br>ampulkostrzykawka                       |                        |               |                |
| 2.  | Szczepionka przeciwko WZW A<br>inaktywowana, dla dzieci od 13 miesiąca<br>życia do 18 roku życia włącznie.<br>cykl szczepień 0 - (6-12 miesięcy).                                                      |                                                    | 50    | 0,5 ml<br>ampulkostrzykawka                       |                        |               |                |
| 3.  | Szczepionka przeciwko WZW A<br>inaktywowana, adsorbowana dla osób<br>dorosłych od 19 roku życia,<br>cykl szczepień 0 - (6 do 12 miesięcy).                                                             |                                                    | 300   | 1,0 ml<br>ampulkostrzykawka                       |                        |               |                |
| 4.  | Szczepionka przeciwko WZW A<br>inaktywowana, adsorbowana dla młodzieży<br>od 16 roku życia i osób dorosłych<br>cykl szczepień 0 - (6 do 12 miesięcy).                                                  |                                                    | 500   | 0,5 ml<br>ampulkostrzykawka                       |                        |               |                |
| 5.  | Szczepionka przeciwko durowi brzuszniemu<br>z polisacharydem otoczkowym Vi, dla osób<br>powyżej 2 roku życia,<br>cykl szczepień 1 dawka na 3 lata.                                                     |                                                    | 700   | 0,5 ml<br>ampulkostrzykawka                       |                        |               |                |
| 6.  | Szczepionka przeciwko błonicy<br>i tężcowi adsorbowana o zmniejszonej<br>zawartości antygenu dla osób powyżej 7 roku<br>życia,<br>cykl szczepień 0-1-( 6-12 miesięcy).                                 |                                                    | 700   | 0,5 ml<br>ampulka lub<br>opakowanie 15<br>dawkowe |                        |               |                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                            |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 7.  | Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (inaktywowana), od 16 roku życia, cykl szczepień 0 - (1-3miesiące) - (5-12 miesięcy), co 3 lata dawka przypominająca, z zarejestrowanym przyspieszonym cyklem szczepień 0-14 doba, 5-12 miesięcy zawierająca szczep Neudörfl.         |  | 10  | 0,5 ml<br>ampułkostrzykawka                                                |  |  |  |
| 8.  | Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (inaktywowana) od 12 roku życia i dorosłych, cykl szczepień: 0- (1-3miesiące) - (9- 2 miesiące) z zarejestrowanym skróconym schematem szczepień: 0 -7 doba- 21 doba, po 12-18 miesiącach dawka przypominająca, zawierająca szczep K23 |  | 10  | 0,5 ml<br>ampułkostrzykawka                                                |  |  |  |
| 9.  | Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce dla osób od 12 miesiąca życia, cykl szczepień 1 dawka                                                                                                                                                                                     |  | 10  | 0,5 ml<br>ampułkostrzykawka<br>lub fiolka (лиофилizat +<br>rozpuszczalnik) |  |  |  |
| 10. | Szczepionka przeciwko poliomyelitis, inaktywowana dla osób po ukończeniu 6 tygodnia życia lub po ukończeniu 2 miesiąca życia, Nieszczepione osoby dorosłe - cykl szczepień 0-1-12 miesięcy,                                                                                              |  | 50  | 0,5ml<br>ampułkostrzykawka                                                 |  |  |  |
| 11. | Szczepionka przeciwko grypie czterowalentna ,inaktywowana, szczepionka typu „Split”, szczepionka na sezon 2019/2020                                                                                                                                                                      |  | 50  | 0,5 ml<br>ampułkostrzykawka                                                |  |  |  |
| 12. | Szczepionka przeciwko żółtej febrze- atenuowana, dla osób powyżej 6 miesiąca życia, cykl szczepień 1 dawka. Okres ochronny wynosi przynajmniej 10 lat i może utrzymywać się przez całe życie.                                                                                            |  | 400 | 0,5 ml<br>лиофилizat +<br>rozpuszczalnik w<br>ampułkostrzykawce            |  |  |  |
| 13. | Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom grupy A, C, W 135, Y cykl szczepień 1 dawka                                                                                                                                                                                              |  | 50  | 0,5 ml<br>лиофилizat +<br>rozpuszczalnik                                   |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |     |                                                               |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 14. | Szczepionka przeciwko wściekliznie inaktywowana, dla dzieci i dorosłych, cykl szczepienia profilaktycznego: szczepienie podstawowe - 3 wstrzyknięcia w dniach 0, 7 i 28, dawka uzupełniająca po upływie 1 roku.                                                                                             |  | 30  | 0,5 ml<br>liofilizat +<br>rozpuszczalnik<br>ampułkostrzykawka |  |  |  |
| 15. | Szczepionka przeciwko WZW E rekombinowana dla dorosłych z zarejestrowanym przyspieszonym cyklem szczepień 0- 7 dzień -21 dzień - 1rok.                                                                                                                                                                      |  | 50  | 1,0 ml<br>fiolka lub<br>ampułkostrzykawka                     |  |  |  |
| 16. | Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenów dla osób w wieku od 3 lat jako szczepienie przypominające.                                                                                       |  | 200 | 0,5 ml<br>ampułkostrzykawka                                   |  |  |  |
| 17. | Szczepionka przeciwko cholercie, inaktywowana, doustna, dla osób po ukończeniu 2 roku życia cykl szczepień:<br>dzieci 2-6 lat szczepienie podstawowe - 3 dawki, dawka przypominająca po 6 miesiącach,<br>dorośli i dzieci powyżej 6 r. ż. szczepienie podstawowe 2 dawki, dawka przypominająca po 2 latach. |  | 50  | opakowania<br>dwudawkowe                                      |  |  |  |
| 18. | Szczepionka przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu, inaktywowana, adsorbowana, dla osób od 2 miesiąca życia, cykl szczepienia podstawowego: 2 dawki w odstępie 28 dni,                                                                                                                                       |  | 50  | 0,5 ml<br>ampułkostrzykawka                                   |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |                             |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------------------|--|--|--|
| 19. | Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana, dla osób w wieku od 2 miesiąca życia<br>cykl szczepień:<br>niemowlęta od 2 do 5 miesiąca życia<br>szczepienie pierwotne -3 dawki<br>niemowlęta od 6 miesiąca życia dzieci<br>młodzież i dorośli - szczepienie pierwotne- 2 dawki |  | 10 | 0.5 ml<br>ampułkostrzykawka |  |  |  |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    |                             |  |  |  |

**Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.**

**Termin ważności szczepionki przeciwko grypie minimum 6 miesięcy od dnia dostawy.**